

ZONE DELIMITATE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE IN CUI E’ PRESENTE IL PUNTERUOLO ROSSO – Definite alla data del 31 dicembre 2015

Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.” ed a seguito delle risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 31 dicembre 2015, si delimitano le seguenti zone:

- A.** ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera *b*) del D.M. 7/2/2011, quale “**zona contenimento**” le aree coincidenti con l’intero territorio dei Comuni dove la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* è tale che i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione come definito al punto 3 dell’Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE, i Comuni di seguito elencati (vedi cartografia, **allegato B**):

ZONE DI CONTENIMENTO - PUNTERUOLO ROSSO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	TERMOLI, CAMPOMARINO, PORTOCANNONE, SAN MARTINO IN PENSILIS, PETACCIATO, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, MONTENERO DI BISACCIA
ISERNIA	VENAFRO, POZZILLI

- B.** ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera *a*) del D.M. 7/2/2011 quale “**zona infestata**”, cioè la zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove è stata accertata e confermata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate tutte le misure fitosanitarie volte all’eradicazione. La stessa per semplicità si fa coincidere con l’intero territorio dei seguenti Comuni (vedi cartografia, **allegato B**):

ZONE INFESTATE - PUNTERUOLO ROSSO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	LARINO, GUGLIONESI, URURI, MONTECILFONE
ISERNIA	

- C.** ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera *c*) del D.M. 7/2/2011 quale “**zona cuscinetto**”, la fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata. In questa zona viene eseguito il monitoraggio intensivo del *Rhynchophorus ferrugineus*. La stessa per semplicità si fa coincidere con l’intero territorio dei seguenti Comuni (vedi cartografia, **allegato B**):

ZONE CUSCINETTO – PUNTERUOLO ROSSO	
PROVINCIA	COMUNE
CAMPOBASSO	MAFALDA, TAVENNA, PALATA, ROTELLO, CASACALENDA, MONTORIO NEI FRENTANI, GUARDIALFIERA
ISERNIA	SESTO CAMPANO, CONCA CASALE, FILIGNANO, MONTAQUILA, MONTERODUNI

